



Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Гинобелс.

Международное непатентованное название: метронидазол + неомицина сульфат + нистатин.

Лекарственная форма: суппозитории вагинальные.

Состав: каждый суппозиторий содержит:

Метронидазол ВР	500 мг;
Неомицин сульфат ВР	65 000 МЕ;
Нистатин ВР	100 000 МЕ;
Вспомогательные вещества	q.s.

Фармакотерапевтическая группа: препарат с антибактериальным, противопротозойным, противогрибковым и противовоспалительным действием для местного применения в гинекологии.

Код АТХ: G01BA.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика:

Комбинированный препарат для местного применения в гинекологии. Действие препарата обусловлено свойствами входящих в его состав компонентов.

Метронидазол – производное 5-нитроимидазола, оказывает противомикробное действие, эффективен относительно простейших. При взаимодействии с протеинами микроорганизмов 5-нитрогруппа Метронидазол восстанавливается и препятствует синтезу нуклеиновых кислот. Угнетение синтеза нуклеиновых кислот приводит к разрушению ДНК микроорганизмов и их гибели. Метронидазол эффективен относительно широкого спектра микроорганизмов и простейших, которые являются причиной вагинальных инфекций, в том числе *Gardnerella vaginalis*, *Streptococcus* spp. и *Trichomonas vaginalis*.

Неомицина сульфат – антибиотик широкого спектра действия из группы аминогликозидов. Действует бактерицидно. Активен в отношении грамположительных (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus pneumoniae*) и грамотрицательных (*Escherichia coli*, *Shigella dysenteriae*, *Shigella flexneri*, *Shigella boydii*, *Shigella sonnei*, *Proteus* spp.) микроорганизмов.

Нистатин – активен в отношении дрожжеподобных грибов рода *Candida*, изменяет проницаемость клеточных мембран и замедляет их рост.

Фармакокинетика:

Исследования фармакокинетики препарата Гинобелс не проводились в связи с низкой системной абсорбцией.

Показания к применению:

Лечение вагинитов, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами:

- бактериальный вагиноз;
- бактериальные вагиниты, вызванные банальной пиогенной или условно патогенной палочковой микрофлорой;
- трихомоноз влагалища;
- вагиниты, вызванные грибами рода *Candida*;
- смешанные вагиниты.

Профилактика вагинитов:

- перед гинекологическими операциями;
- перед родами или абортom;
- до и после установки ВМС;
- до и после диатермокоагуляции шейки матки;
- перед гистерографией.

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- I триместр беременности.

Беременность и лактация:

Возможно применение препарата Гинобелс со II- триместра беременности с учетом пользы для матери и риска для плода.

При необходимости применения в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Способ применения и дозы:

Назначают по 1 суппозиторию в сутки перед сном.

Средняя продолжительность курса терапии - 10 дней; в случае *подтвержденного микоза* может быть увеличена до 20 дней. Не следует прекращать лечение во время менструации.

Вводят глубоко во влагалище в положении лежа. После введения необходимо находиться в горизонтальном положении в течение 10-15 минут.

Побочные действия:

Местные реакции: редко - чувство жжения, местное раздражение (особенно в начале терапии).

Прочие: крайне редко - аллергические реакции.

Передозировка:

В связи с низкой степенью абсорбции в системный кровоток передозировка маловероятна.

Лекарственные взаимодействия:

Клинически значимого лекарственного взаимодействия препарата с другими лекарственными средствами не выявлено.

Особые указания:

При вагинитах и трихомонозе необходимо провести одновременное лечение полового партнера из-за опасности повторного заражения.

Форма выпуска:

5 вагинальных суппозиториях в каждом блистере ПВХ. 2 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С и в местах, недоступных для детей.

Срок хранения:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

По рецепту врача.