

**Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства**

Торговое название: Кедд.

Международное непатентованное название: Клиндамицин + Клотримазол.

Лекарственная форма: мягкие желатиновые вагинальные капсулы.

Состав: каждая мягкая желатиновая вагинальная капсула содержит:

Клиндамицина фосфат ВР экв. клиндамицину 100 мг;

Клотримазол ВР 100 мг.

Фармакотерапевтическая группа: Антибактериальные и противогрибковые препараты для лечения гинекологических заболеваний.

Код АТХ: G01A.

Фармакологическое действие:

Фармакодинамика:

Клиндамицин — препарат из группы антибиотиков — линкозамидов, обладает широким спектром действия, бактериостатик, связывается с 50S субъединицей рибосомы и ингибирует синтез белка в микроорганизмах. Активен в отношении всех возбудителей бактериальных вагинозов (*Gardnerella vaginalis*, *Mobiluncus mulieris*, *Mobiluncus curtisi*), стрептококков (исключая энтерококки), пневмококков, анаэробных и аэробных грамположительных кокков (включая пептококки и пептострептококки), палочек дифтерии, возбудителей газовой гангрены и столбняка, микоплазм, бактериоидов (включая *Bacteroides fragilis* и *Bacteroides melanogenicus*), анаэробных грамотрицательных бацилл (включая *Fusobacterium*), номицетов и клоstrидий, анаэробных грамположительных, не образующих спор, бацилл (включая пропионибактериум, эубактериум и актиномицеты). Большинство штаммов *Clostridium perfringens* чувствительны к клиндамицину, однако, так как другие виды клоstrидий (*Clostridium sporogenes*, *Clostridium tertium*) устойчивы к действию клиндамицина, то при инфекциях, вызванных клоstrидиями рекомендуется определение антибиотикограммы. Клинически неэффективен против *Mycoplasma pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Helicobacter pylori*, *Neisseria meningitidis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Ureaplasma urealyticum*. Между клиндамицином и линкормицином существует перекрестная устойчивость.

Клотримазол — производное имидазола, противогрибковое средство для местного применения. Механизм действия обусловлен нарушением синтеза эргостерола, являющегося составной частью клеточной мембрany грибов. Обладает широким спектром действия. Активен в отношении дерматофитов, *Candida albicans*, *Malassezia furfur*; *Corynebacterium minutissimum*, *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Trichomonas vaginalis*.

Фармакокинетика:

Фармакокинетические свойства: при интравагинальном введении вагинальных капсул, содержащих 100 мг клиндамицина, 1 раз в сутки, системному всасыванию подвергается около 3–30% препарата. При интравагинальном введении абсорбируется от 5 до 10% клотримазола. Абсорбированные вещества метаболизируются в печени и выводятся с желчью.

Показания к применению:

- бактериальный вагиноз;
- вагиниты бактериальной, трихомонадной, грибковой или смешанной этиологии;
- профилактика суперинфекции влагалища при лечении кортикостероидами, иммуносупрессорами, цитостатиками, антибиотиками;
- предоперационная подготовка при операциях на матке: пред- и послеоперационный период при хирургическом вмешательстве на шейку матки, влагалище и вульву;
- гинекологические инфекции (колпакт, эндометрит, аднексит, абсцессы труб и яичников, сальпингит, пельвиоперитонит), вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами.

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к клиндамицину, клотримазолу или другим компонентам препарата;
- I триместр беременности;
- детский возраст и девственность.

Беременность и период лактации.

Препарат следует применять с осторожностью во время беременности, только тогда, когда ожидаемая польза для матери превосходит потенциальный риск для плода или ребёнка. В период кормления грудью, следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Способ применения и дозы:

Интравагинально. Вагинальные капсулы освобождают от контурной упаковки, вводят по возможности глубоко во влагалище, в положении лежа.

Для лечения бактериального вагиноза - по 1 капсуле в сутки, желательно на ночь в течении 7 дней;

Для лечения бактериальных и других гинекологических инфекций - по 1 капсуле в сутки на ночь, в течении 7 дней.

Продолжительность терапии определяет врач, возможен повторный курс, после консультации врача.

Для санации половых путей перед гинекологическими манипуляциями: по 1 капсуле интравагинально за 3 дня до начала процедуры и 4 дня после процедуры по 1 капсуле в сутки во влагалище. Не применять во время менструации.

Для профилактики - по 1 капсуле вечером, каждые 7-10 дней.

Побочные действия:

Возможны:

- аллергические реакции (кожный зуд, жжение, выделения из влагалища);
- очень редко (менее 1%): нарушение менструального цикла;
- лихорадка;
- головная боль;
- тошнота, рвота, псевдомембранный колит, диарея, запор.

Передозировка:

О случаях передозировки препаратом не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат усиливает действие антикоагулянтов. Дексаметазон в высоких дозах угнетает противогрибковое действие клотримазола. Нестероидные противовоспалительные средства и сульфаниламиды потенцируют действие препарата.

Особые указания:

Во время лечения противопоказаны алкогольные напитки.

Интравагинально не рекомендуется применять одновременно с другими интравагинальными средствами.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами.

Не установлены.

Форма выпуска:

7 мягких, желатиновых, вагинальных капсул в контурной ячейковой упаковке. Одна контурная ячейковая упаковка вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C и в местах, недоступных для детей.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

По рецепту врача.

 SPEY

Произведено для:
SPEY MEDICAL

Лондон, Великобритания

Производитель:
Оущен Хелскеа Птв. Лтд.

Индия