

ПРОСТАНЕКТ А

Инструкция по применению

Торговое название: Простанект А.

Международное непатентованное название: нет.

Лекарственная форма: суппозитории ректальные.

Состав: каждый суппозиторий содержит:

активные вещества:

Лактоферрин 30 мг;

Глицерофосфоинозитол 40 мг;

Гиалуриновая кислота 20 мг.

вспомогательные вещества: коллоидный диоксид кремния безводный (Аэросил 200), твердый жир.

Фармакологическое действие:

Простанект А - благодаря местному защитному и смазывающему действию в аноректальной области, оказывает благотворное влияние как при острых, так и при хронических заболеваниях предстательной железы, облегчая болевые симптомы, помогая при простатите. Также препарат подходит для кратковременного использования при запорах и застойных явлениях в органах малого таза благодаря успокаивающему действию.

Лактоферрин - полифункциональный железосодержащий белок семейства трансферринов, высвобождающийся из гранул нейтрофилов и моноцитов в очаге воспаления. Лактоферрин блокирует рост бактерий, эффект усиливается при присутствии антибактериальных иммуноглобулинов А.

Глицерофосфоинозитол - растительный фосфолипид, натуральное противовоспалительное вещество. Предотвращает зуд и раздражение.

Гиалуриновая кислота функционирует как структурная поддержка, обеспечивая тонус тканей, питание и эластичность.

Гиалуриновая кислота ускоряет и улучшает процесс эпителизации и восстановления тканей.

Показания к применению:

✓ облегчение симптомов, характерных при острых и хронических заболеваниях предстательной железы;

✓ вспомогательное средство при простатите;

✓ как вспомогательное средство, для кратковременного использования при запорах и застойных явлениях в органах малого таза.

Противопоказания:

✓ гиперчувствительность к компонентам препарата;

✓ детский возраст до 12 лет;

✓ острая абдоминальная боль или боль неясного генеза;

✓ тошнота или рвота;

✓ кишечная непроходимость или стеноз;

✓ ректальное кровотечение неясного генеза;

✓ острый геморроидальный криз с болью и кровотечением;

✓ тяжелая форма обезвоживания.

Беременность и период лактации:

Нет данных о применении препарата Простанект А при беременности или кормлении грудью, перед применением нужно проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы:

Ректально. Рекомендуется один суппозиторий в день, желательно вечером перед сном. Рекомендуется правильно применять суппозиторий для оптимального функционирования, следя за тем, чтобы он был правильно введен в самую глубокую часть ректальной полости, после клизмы или самостоятельного опорожнения кишечника. Перед применением суппозиторий следует извлечь из контурной ячейковой упаковки.

Длительность курса зависит от показаний и определяется лечащим врачом.

Можно назначать продукт в течение 1 месяца, продление курса при необходимости еще на месяц, после консультации с врачом.

Побочные действия:

Серьезные побочные эффекты не отмечались.

Передозировка:

Случаев передозировки не наблюдалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие с препаратом Простанект А не изучалось.

Не используйте вместе с другими средствами для ректального применения.

Особые указания:

После применения суппозитория следует тщательно вымыть руки.

При длительном применении средства, предназначенного для местного использования, может развиться симптомы гиперчувствительности, в этом случае необходимо прекратить лечение и проконсультироваться с врачом.

Неравномерный темный цвет, который может иметь суппозиторий, является характеристикой продукта и не свидетельствует о снижении эффективности или плохом хранении суппозитория.

Суппозитории предназначены для ректального применения и не могут использоваться по-другому.

Каждый суппозиторий предназначен только для однократного применения и должен быть извлечен из упаковки только непосредственно перед использованием. Не используйте суппозитории, которые были сломаны или извлечены из блистерной упаковки в неизвестное время, а также если повреждена внутренняя упаковка.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Не влияет на способность пациента к управлению автотранспортным средством или потенциально опасными механизмами.

Форма выпуска:

Суппозитории ректальные. По 5 суппозитория в контурной ячейковой упаковке. 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещаются в картонную пачку.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.

Произведено для:

SPEY MEDICAL LTD.,



Лондон, Великобритания

Производитель:

Fulton Mediciali S.p.A.

Италия