

# ПРОСТАНЕКТ

## Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства



**Торговое название:** Простанект.

**Международное непатентованное название:** нет.

**Лекарственная форма:**

суппозитории ректальные.

**Состав:** один суппозиторий содержит:  
*активные вещества:*

Простаты экстракт.....30 мг

в пересчете на водорастворимые

пептиды - 3,5 мг)

Масло семян тыквы.....400 мг

Масло семян амаранта .....100 мг

*вспомогательные вещества:* основа для суппозиторияв - жир твердый (витепсол) - достаточное количество до получения суппозитория массы 2,0 г.

**Фармакотерапевтическая группа:**

препараты, используемые в урологии.

**Код АТХ:** G04BX.

**Фармакологическое действие:**

*Фармакодинамика:*

Простанект обладает органотропным действием в отношении предстательной железы. Уменьшает степень отека, лейкоцитарной инфильтрации предстательной железы, нормализует секреторную функцию эпителиальных клеток, увеличивает число лецитиновых зерен в секрете ацинусов, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря. Улучшает микроциркуляцию в предстательной железе за счет уменьшения тромбообразования, антиагрегантной активности, препятствует развитию тромбоза венул в предстательной железе. Простанект способствует нормализации параметров предстательной железы и эякулята. Уменьшает боль и дискомфорт, устраняет дизурические явления, улучшает копулятивную функцию. Препарат обладает противовоспалительным и антиагрегационным действием, стимулирует мышцы мочевого пузыря. Действующие вещества экстракта простаты относят к группе пептидных биорегуляторов - цитомединов, которые представляют собой пептиды с молекулярной массой от 1 до 10 кДа. Низкомолекулярные пептиды пара- или аутокринной природы выполняют функцию трансспецифичных внутри - и межклеточных мессенджеров. Пептиды предстательной железы уменьшают время свертывания крови и повышают ангиагрегационную активность сосудистой стенки, улучшают микроциркуляцию крови, усиливают фибринолитическую активность крови, увеличивают сократительную активность миоцитов детрузора *in vivo* и *in vitro*. Обладают иммуномодулирующим и иммуностимулирующим действием, оказывают не прямое противовоспалительное действие за счет усиления синтеза антигистаминовых и антисеротониновых антител. Лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы основано на важнейшем биологическом эффекте цитомединов: органотропности, позволяющей регулировать процессы дифференцировки и функции клеток в том органе, из которого они выделены.

*Фармакокинетика:*

Нет данных.

**Показания к применению:**

- хронический простатит (в составе комплексной терапии);
- состояния до и после оперативных вмешательств на

предстательной железе;

- доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

**Противопоказания:**

- Гиперчувствительность к компонентам препарата.
- Возраст до 18 лет (период формирования и роста скелета).

**Способ применения и дозы:**

Ректально, по 1 суппозиторию 1 раз в день после клизмы или самостоятельного опорожнения кишечника. Перед применением суппозиторий следует извлечь из контурной ячейковой упаковки. После введения препарата Простанект желателен в течение 30 - 40 минут находиться в постели.

Курс лечения продолжается до исчезновения возбудителя в секрете простаты и составляет от 10 до 30 дней.

**Передозировка:**

Препарат Простанект не токсичен, случаев передозировки не наблюдалось.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Лекарственное взаимодействие с препаратом Простанект не изучалось.

**Особые указания:**

Безопасность применения суппозитория следует тщательно вымыть руки.

Препарат предназначен только для мужчин.

*Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами*

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Форма выпуска:**

Суппозитории ректальные.

5 суппозитория в контурной ячейковой упаковке. 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещаются в картонную пачку.

**Условия хранения:**

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не замораживать.

**Срок годности:**

2 года.

Не использовать по истечении срока годности.

**Условия отпуска:**

Без рецепта.



Произведено для:

**SPEY MEDICAL LTD.,**

Лондон, Великобритания

Производитель:

ООО «ОФФИЦИНА»

Грузия